

## **Pakuotės lapelis: informacija vartotojui**

### **Ibuprofen Inteli 600 mg plėvele dengtos tabletės** ibuprofenas

**Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.**

- Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
- Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
- Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų).
- Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Žr. 4 skyrių.

#### **Apie ką rašoma šiame lapelyje?**

1. Kas yra Ibuprofen Inteli ir kam jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant Ibuprofen Inteli
3. Kaip vartoti Ibuprofen Inteli
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti Ibuprofen Inteli
6. Pakuotės turinys ir kita informacija

#### **1. Kas yra Ibuprofen Inteli ir kam jis vartojamas**

Ibuprofen Inteli, kurio veiklioji medžiaga yra ibuprofenas, priklauso nesteroidinių vaistų nuo uždegimo (NVNU) grupei.

Šis vaistas skirtas:

- skausmui ir uždegimui mažinti, esant reumatoidiniam sąnarių uždegimui, stuburo sąnarių uždegimui (ankilozuojančiam spondilitui), osteoartritui, peties sąnario ankštumo sindromui, tepalinio sąnario maišelio uždegimui, sausgyslės uždegimui, sausgyslės makšties uždegimui, apatinės nugaros dalies skausmui, patempimams;
- silpno ir vidutinio stiprumo skausmui, tokiam kaip danties, pooperacinis ar galvos skausmas (įskaitant migreninį), skausmingos menstruacijos, lengvinti.

#### **2. Kas žinotina prieš vartojant Ibuprofen Inteli**

##### **Ibuprofen Inteli vartoti draudžiama:**

- jeigu yra alergija ibuprofenui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos 6 skyriuje);
- jeigu yra alergija aspirinui arba kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo (kada nors praeityje pavartojus šių vaistų yra pasireiškusi astma, išskyros iš nosies, odos niežulys, lūpų, veido ar gerklės pabrinkimas);
- jeigu yra (arba praeityje buvo du ar daugiau epizodų) peptinė opa (opa skrandyje arba dvylikapirštėje žarnoje), jos prakiurimas arba kraujavimas;
- jeigu praeityje yra buvęs kraujavimas iš virškinimo trakto ar jo perforacija, susiję su nesteroidinių vaistų nuo uždegimo vartojimu;
- jeigu yra kraujavimas į smegenis, virškinimo traktą arba kitoks kraujavimas bei kitos ligos, dėl kurių yra padidėjusi kraujavimo rizika;
- jeigu sergate sunkiu kepenų, inkstų arba širdies nepakankamumu;
- paskutiniaisiais 3 nėštumo mėnesiais;
- jaunesniems negu 12 metų vaikams.

## **Įspėjimai ir atsargumo priemonės**

Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Ibuprofen Inteli. Ypač svarbu pasakyti gydytojui arba vaistininkui, jeigu Jums yra bet kuri iš šių ligų ar būklių:

- tam tikros odos ligos (sisteminė raudonoji vilkligė arba mišri jungiamojo audinio liga);
- virškinimo sutrikimai arba lėtinė uždegiminė žarnyno liga (opinis kolitas, Krono liga);
- inkstų arba kepenų funkcijos sutrikimai;
- astma ar alerginės ligos – šis vaistas gali sukelti bronchų spazmą (jo simptomai yra švokštimas arba pasunkėjęs kvėpavimas);
- lėtinė sloga, sinusų uždegimas ar nosies polipai – alerginių reakcijų rizika yra didesnė;
- esate senyvo amžiaus – senyvo amžiaus pacientams šalutinio poveikio rizika yra didesnė;
- dehidratacija (pvz., organizme trūksta vandens ir skysčių, dažniausiai dėl vėmimo, viduriavimo arba nepakankamo skysčių vartojimo) – dehidratuotiems vaikams ir paaugliams yra didesnė inkstų nepakankamumo rizika;
- vartojate bet kokių kitų vaistų (žr. skyrių „Kiti vaistai ir Ibuprofen Inteli“).

Šalutinio poveikio riziką galima sumažinti vartojant mažiausią vaisto dozę trumpiausią laiką, reikalingą palengvinti simptomams.

Jeigu Ibuprofen Inteli reikia vartoti ilgą laiką, turi būti reguliariai atliekami kepenų, inkstų bei kraujo tyrimai.

Jei sergate arba anksčiau sirgote virškinamojo trakto liga arba esate senyvo amžiaus, pasireiškus neįprastiems su virškinimo traktu susijusiems požymiams (pavyzdžiui, kraujavimui), ypač gydymo pradžioje, pasitarkite su savo gydytoju. Kraujavimas iš skrandžio arba žarnyno, opos ar perforacijos, kurios gali baigtis mirtimi, gali pasireikšti su įspėjamaisiais požymiais arba be jų. Jeigu pastebėjote kraujavimo iš virškinamojo trakto požymių (stiprų pilvo skausmą, juodos arba deguto spalvos išmatas, vemiate krauju ar tamsiomis dalelėmis, panašiomis į kavos tirščius), nedelsiant nutraukite vaisto vartojimą ir kreipkitės į gydytoją (žr. „Galimas šalutinis poveikis“).

Tokie skausmą malšinantys ir uždegimą slopinantys vaistai kaip ibuprofenas, ypač vartojami didelėmis dozėmis, gali būti susiję su nedideliu širdies priepuolio ar insulto rizikos padidėjimu. Bet kokia rizika yra labiau tikėtina ilgą laiką vartojant vaisto didelėmis dozėmis. Neviršykite rekomenduotos dozės ar gydymo trukmės.

Prieš pradėdami vartoti Ibuprofen Inteli dėl gydymo pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, jeigu:

- Jums pasireiškia širdies problemų, įskaitant širdies nepakankamumą, krūtinės anginą (jaučiate skausmą krūtinėje), arba jeigu Jums buvo širdies priepuolis, atlikta širdies kraujagyslių jungčių suformavimo operacija, diagnozuota periferinių arterijų liga (prasta kraujotaka pėdose dėl susiaurėjusių arba užsikimšusių arterijų) arba buvo ištikęs bet kokios rūšies insultas (įskaitant mini insultą arba praeinantį smegenų išemijos priepuolį (PSIP));
- Jūsų kraujospūdis yra padidėjęs, sergate cukriniu diabetu, nustatytas didelis cholesterolio kiekis, buvo širdies liga sirgusių giminaičių arba giminaičių, kuriuos ištiko insultas, arba jeigu rūkote.

### **Odos reakcijos**

Vartojant Ibuprofen Inteli buvo pranešta apie sunkias odos reakcijas. Jei Jums pasireiškė odos išbėrimas, gleivinių pažeidimas, pūslės ar kitų alergijos požymių, Ibuprofen Inteli vartojimą nutraukite ir nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos, nes tai gali būti pirmieji labai sunkios odos reakcijos požymiai. Žr. 4 skyrių.

Jeigu Jums pasireiškė regėjimo sutrikimai, nutraukite vaisto vartojimą ir kreipkitės į gydytoją.

Jei sergate vėjaraupiais, rekomenduojama vengti vartoti šio vaisto.

Kaip ir kiti vaistai nuo uždegimo, Ibuprofen Inteli gali maskuoti infekcijos simptomus.

Jeigu skausmą malšinančius vaistus vartojate ilgą laiką, jie gali sukelti galvos skausmą, kurio negalima gydyti vartojant daugiau skausmą malšinančių vaistų. Jeigu manote, kad tai Jums tinka, pasitarkite su gydytoju ar vaistininku.

### **Vaikams ir paaugliams**

*Jaunesniems kaip 12 metų vaikams ir paaugliams*

Šis vaistas neskirtas vaikams ir paaugliams, jaunesniems kaip 12 metų.

### **Kiti vaistai ir Ibuprofen Inteli**

Jeigu vartojate ar neseniai vartojote kitų vaistų arba dėl to nesate tikri, apie tai pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Nevartokite Ibuprofen Inteli kartu su:

- bet kuriais kitais vaistais nuo skausmo (nesteroidiniais vaistais nuo uždegimo, įskaitant aspiriną, vartojamą didesnėmis kaip 75 mg paros dozėmis, ibuprofeną, naprokseną, selektyvius ciklooksigenazės-2 inhibitorius).

Ibuprofen Inteli gali turėti įtakos kai kuriems kitiems vaistams arba gali būti jų veikiamas. Pavyzdžiui:

- vaistai, kurie yra antikoagulantai (t. y. kraują skystinantys arba kraujo krešėjimą mažinantys, pvz., aspirinas ar acetilsalicilo rūgštis, varfarinas, tiklopidinas) – kartu vartojamas ibuprofenas gali padidinti kraujavimo riziką;
- vaistai, kurie mažina didelį kraujospūdį (AKF inhibitoriai, pvz., kaptoprilis, beta-adrenoreceptorius blokuojantys vaistai, pvz., atenololis, angiotenzino II receptorių blokatoriai, pvz., losartanas, diuretikai, pvz., indapamidas) – ibuprofenas gali sumažinti jų veiksmingumą;
- vaistai nuo depresijos (selektyvūs serotonino reabsorbcijos inhibitoriai, pvz., fluoksetinas, sertralinas, paroksetinas, litis);
- kortikosteroidai (pvz., prednizolonas, deksametazonas), vartojami uždegimui ir alergijai gydyti;
- metotreksatas (vartojamas tam tikroms uždegiminėms ligoms ir vėžiui gydyti);
- širdies glikozidai (pvz., digoksinas), vartojami esant širdies nepakankamumui;
- ciklosporinas arba takrolimusas (imunitetą slopinantys vaistai, dažnai vartojami po organo persodinimo operacijos);
- zidovudinas (vaistas ŽIV gydyti);
- antibiotikai, vadinami chinolonais (pvz., nalidikso rūgštis, ofloksacinas, ciprofloksacinas) arba aminoglikozidais (pvz., streptomocinas, tobramicinas, gentamicinas);
- fenitoinas (vartojamas epilepsijai gydyti);
- mifepristonas (vaistas, vartojamas medicininiam nėštumo nutraukimui);
- kolestiraminas (vartojamas cholesterolio kiekiui mažinti);
- vaistai, vadinami sulfonilkarbamidais (pvz., glibenklamidas, vartojamas cukriniam diabetui gydyti);
- vaistai, vadinami CYP2C9 inhibitoriais (pvz., vorikonazolas, flukonazolas);
- ginkmedis (augalinis vaistas).

Kai kurie kiti vaistai taip pat gali turėti įtakos gydymui Ibuprofen Inteli arba gali būti jo veikiami. Todėl prieš vartodami Ibuprofen Inteli su kitais vaistais visada pasitarkite su gydytoju arba vaistininku.

### **Ibuprofen Inteli vartojimas su maistu, gėrimais ir alkoholiu**

Pacientams, kurių skrandis jautrus, rekomenduojama ibuprofeno vartoti su maistu. Tabletes reikia vartoti užsigeriant stikline vandens.

Venkite alkoholio, kol vartojate Ibuprofen Inteli.

### **Nėštumas, žindymo laikotarpis ir vaisingumas**

Jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia, arba planuojate pastoti, tai prieš vartodama šį vaistą pasitarkite su gydytoju arba vaistininku.

Nevartokite Ibuprofen Inteli paskutinius 3 nėštumo mėnesius. Šis vaistas gali sukelti vaisiaus inkstų ir širdies sutrikimų. Jis gali paveikti Jūsų ir Jūsų kūdikio polinkį kraujuoti ir dėl jo gimdymas gali būti vėlesnis arba ilgesnis, nei tikėtasi. Pirmus 6 nėštumo mėnesius Ibuprofen Inteli vartoti negalima, išskyrus atvejus, kai tai neabejotinai būtina ir taip pataria gydytojas.

Nuo 20-osios nėštumo savaitės Ibuprofen Inteli gali sukelti vaisiaus inkstų sutrikimų, jei šis vaistas vartojamas ilgiau nei kelias dienas, o dėl to gali sumažėti kūdikį supančio amniono skysčio kiekis (oligohidramnionas) arba susiaurėti kūdikio širdies kraujagyslė (arterinis latakas). Jei Jums reikalingas ilgesnis nei kelių dienų gydymas, gydytojas gali rekomenduoti papildomą stebėseną.

Nerekomenduojama Ibuprofen Inteli vartoti žindymo laikotarpiu.

Ibuprofen Inteli priklauso vaistų, kurie gali daryti poveikį moterų vaisingumui, grupei. Šis poveikis išnyksta nutraukus vaisto vartojimą. Mažai tikėtina, kad Ibuprofen Inteli, vartojamas retkarčiais, galėtų turėti įtakos Jūsų galimybei pastoti. Tačiau jeigu turite problemų dėl pastojimo, pasitarkite su gydytoju prieš pradėdama vartoti šio vaisto.

### **Vairavimas ir mechanizmų valdymas**

Vartodami šio vaisto, būkite atsargūs vairuodami ir valdydami mechanizmus. Ibuprofen Inteli vartojimas gali sukelti nuovargį, mieguistumą, galvos svaigimą ir regos sutrikimus.

### **Ibuprofen Inteli sudėtyje yra natrio**

Šio vaisto vienoje tabletėje yra mažiau kaip 1 mmol (23 mg) natrio, t. y. jis beveik neturi reikšmės.

## **3. Kaip vartoti Ibuprofen Inteli**

Šį vaistą visada vartokite tiksliai, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

### *Suaugusiems*

Rekomenduojama dozė yra 1 tabletė (600 mg ibuprofeno) vartojama du ar tris kartus per parą. Jūsų gydytojas gali nuspręsti sumažinti arba padidinti šią dozę priklausomai nuo to, kokiai ligai gydyti skiriamas vaistas. Nevartokite daugiau nei 4 tablečių (2400 mg ibuprofeno) per 24 valandas.

### *Vaikams ir paaugliams*

Dėl per didelio veikliosios medžiagos kiekio Ibuprofen Inteli negalima vartoti jaunesniems nei 12 metų vaikams ir paaugliams.

Vartoti per burną, užgeriant stikline vandens. Tabletę reikia nuryti visą. Siekiant išvengti nemalonaus pojūčio burnoje bei sudirginimo gerklėje, jos negalima kramtyti, smulkinti ar čiulpti.

Jeigu Jūs sergate sunkia kepenų ar inkstų liga, arba esate senyvo amžiaus, gydytojas Jums paskirs mažiausią veiksmingą vaisto dozę.

### **Ką daryti pavartojus per didelę Ibuprofen Inteli dozę**

Jei pavartojote per didelę Ibuprofen Inteli dozę, nedelsiant kreipkitės į gydytoją.

Perdozavimo simptomai yra pykinimas, vėmimas, skrandžio skausmas, viduriavimas, ūžimas ausyse, galvos svaigimas ir skausmas, kraujavimas iš virškinimo trakto. Sunkiais apsinuodijimo atvejais gali pasireikšti mieguistumas, sujaudinimas, orientacijos sutrikimas, koma, traukuliai, sumažėjęs kraujospūdis, inkstų ar kepenų pažeidimas.

### **Pamiršus pavartoti Ibuprofen Inteli**

Jeigu pamiršote pavartoti vaisto ir vis dar jaučiate ligos simptomus, pavartokite tabletę, kai tik prisiminsite. Jei iki kitos dozės liko mažiau kaip 4 valandos, nebevartokite praleistos dozės. Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę.

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

#### 4. Galimas šalutinis poveikis

Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Nustokite vartoti šio vaisto ir nedelsiant kreipkitės medicininės pagalbos, jeigu Jums pasireiškė bet kuris iš toliau išvardyto sunkaus šalutinio poveikio.

- Pasireiškė kraujavimo iš virškinamojo trakto simptomų: stiprus pilvo skausmas, juodos arba deguto spalvos išmatos, vėmimas krauju ar tamsiomis dalelėmis, panašiomis į kavos tirščius.
- Pablogėjo kolito ar Krono ligos (uždegiminė žarnyno liga) simptomai.
- Padidėjo arba sumažėjo šlapimo kiekis, šlapimas tapo drumstas arba jame atsirado kraujo, pasireiškė nugaros skausmas ir (arba) kūno pabrinkimas. Tai gali būti sunkaus inkstų sutrikimo (pvz., ūminio inkstų nepakankamumo, inkstų papiliarinės nekrozės (inkstų sutrikimas, kai žūva visi arba dalis inkstų spenelių) požymiai.
- Pasireiškė kaklo sustingimas, galvos skausmas, pykinimas, vėmimas, karščiavimas ar sąmonės aptemimas. Tai gali būti aseptinio meningito (smegenų dangalų uždegimo) požymiai. Tokio šalutinio poveikio rizika yra didesnė pacientams, sergantiems autoimuninėmis ligomis (sisteminė raudonąja vilklige, mišria jungiamojo audinio liga).
- Pasireiškė sunkių alerginių reakcijų požymiai: bronchinės astmos pablogėjimas, nepaaiškinamas švokštimas ar dusulys, veido, liežuvio ar gerklės pabrinkimas (angioneurozinė edema), kvėpavimo pasunkėjimas, širdies plakimo padažnėjimas, kraujospūdžio sumažėjimas, galintis sukelti šoką. Šie simptomai gali pasireikšti net po pirmos vaisto dozės.
- Odos ir akių pageltimas, šviesios spalvos išmatos, tamsios spalvos šlapimas. Tai gali būti kepenų veiklos sutrikimo arba nepakankamumo požymiai. Tai labiau tikėtina, jeigu Ibuprofen Inteli vartojamas ilgą laiką.
- Viso kūno išbėrimas, odos lupimasis, odos pūslelės arba pleiskanojimas. Tai gali būti sunkios odos reakcijos (daugiaformė eritema, Stivenso-Džonsono sindromas, toksinė epidermio nekrolizė, eksfoliacinis dermatitas).
- Reakcija į vaistą su eozinofilija ir sisteminiais simptomais (*DRESS* sindromas). *DRESS* simptomai gali būti tokie: odos išbėrimas, karščiavimas, padidėję limfmazgiai ir padidėjęs eozinofilų (baltųjų kraujo kūnelių rūšis) skaičius.
- Oda įsijautrina šviesai (dažnis nežinomas).
- Gydomo pradžioje kartu su karščiavimu pasireiškiantis raudonas, žvynuotas, išplitęs išbėrimas su poodiniais gumbeliais ir pūslelėmis, dažniausiai pažeidžiantis odos raukšles, liemenį ir viršutines galūnes (ūminė generalizuota egzanteminė pustuliozė). Jei Jums pasireiškė šių simptomų, nutraukite Ibuprofen Inteli vartojimą ir nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos. Taip pat žr. 2 skyrių.

Tokie vaistai kaip Ibuprofen Inteli gali būti susiję su širdies priepuolio (miokardo infarkto) ar insulto rizikos nedideliu padidėjimu (žr. „Išpėjimai ir atsargumo priemonės“). Širdies priepuolio simptomai yra krūtinės skausmas, oro trūkumas, svaigulys ir (arba) apalpimas, pykinimas ir kiti. Insulto simptomai yra staigus tirpimo pojūtis, dilgčiojimas, silpnumas, veido, rankos ar kojos judesių išnykimas, ypač vienos kurios nors kūno pusės, regos sutrikimai, kalbos sutrikimai ir kiti.

Kitas šalutinis poveikis išvardintas toliau.

#### ***Dažni šalutinio poveikio reiškiniai (gali pasireikšti rečiau kaip 1 iš 10 asmenų)***

- Galvos svaigimas.
- Galvos skausmas.
- Nuovargis.
- Sujaudinimas.
- Dirglumas.
- Pilvo skausmas.
- Virškinimo sutrikimai.
- Pykinimas.
- Vėmimas.

- Viduriavimas.
- Vidurių pūtimas.
- Vidurių užkietėjimas.
- Juodos išmatos.
- Vėmimas krauju.
- Kraujavimas iš virškinamojo trakto.
- Išbėrimas.

***Nedažni šalutinio poveikio reiškiniai (gali pasireikšti rečiau kaip 1 iš 100 asmenų)***

- Sumažėjęs kraujo ląstelių skaičius (mažakraujystė, leukocitų, trombocitų skaičiaus sumažėjimas), kuris pasireiškia odos blyškumu, į gripą panašiais simptomais, silpnumu, lengvai susidarantiomis mėlynėmis, kraujavimu iš nosies ar odoje.
- Jutimų sutrikimas (toks kaip tirpimas, dilgčiojimas).
- Mieguistumas.
- Regėjimo sutrikimai.
- Klausos sutrikimas.
- Išskyros iš nosies.
- Skrandžio uždegimas.
- Dvylikapirštės žarnos opa.
- Skrandžio opa.
- Burnos gleivinės išopėjimas.
- Virškinimo trakto prakiurimas ar kraujavimas iš jo, kurie gali būti mirtini.
- Inkstų sutrikimai, sumažėjęs šlapimo kiekis.
- Dilgėlinė.
- Niežulys.
- Išbėrimas smulkiais rausvais taškeliais (purpura).
- Padidėjusio jautrumo į šviesą reakcijos.
- Kepenų funkcijos sutrikimas, ypač ilgai trunkančio gydymo metu.
- Hepatitas.
- Gelta.
- Nervingumas.
- Nemiga.

***Reti šalutinio poveikio reiškiniai (gali pasireikšti rečiau kaip 1 iš 1 000 asmenų)***

- Viduriavimas.
- Pilvo pūtimas.
- Vidurių užkietėjimas.
- Vėmimas.
- Regos nervo uždegimas.
- Toksinė optinė neuropatija.
- Ūžesys ausyse.
- Svaigulys.
- Edema (pabrinkimas).
- Kepenų pažeidimas.
- Depresija.
- Sumišimas.

***Labai reti šalutinio poveikio reiškiniai (gali pasireikšti rečiau kaip 1 iš 10 000 asmenų)***

- Pakitę laboratorinių tyrimų rezultatai, pvz., sumažėjęs hematokrito ar hemoglobino kiekis.
- Kasos uždegimas.
- Kepenų nepakankamumas.

***Dažnis nežinomas (negali būti apskaičiuotas pagal turimus duomenis)***

- Širdies nepakankamumas.
- Miokardo infarktas.
- Opinio kolito ir Krono ligos paūmėjimas.
- Aukštas kraujospūdis.

- Kraujagyslių uždegimas (vaskulitas).

### **Pranešimas apie šalutinį poveikį**

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Pranešimą apie šalutinį poveikį galite pateikti šiais būdais: tiesiogiai užpildant formą internetu Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Vaistinių preparatų informacinėje sistemoje <https://vapris.vvkt.lt/vvkt-web/public/nrv> arba užpildant Paciento pranešimo apie įtariamą nepageidaujama reakciją (INR) formą, kuri skelbiama <https://www.vvkt.lt/index.php?4004286486>, ir atsiunčiant elektroniniu paštu (adresu [NepageidaujamaR@vvkt.lt](mailto:NepageidaujamaR@vvkt.lt)) arba nemokamu telefonu 8 800 73 568. Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

## **5. Kaip laikyti Ibuprofen Inteli**

Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Šiam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.

Ant dėžutės ir lizdinės plokštelės po „EXP“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio vaisto vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją arba su buitinėmis atliekomis. Kaip išmesti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

## **6. Pakuotės turinys ir kita informacija**

### **Ibuprofen Inteli sudėtis**

- Veiklioji medžiaga yra ibuprofenas. Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 600 mg ibuprofeno.
- Pagalbinės medžiagos tabletės šerdyje yra mikrokristalinė celiuliozė, kalcio fosfatas, kroskarmeliozės natrio druska, povidonas, stearino rūgštis, talkas. Pagalbinės medžiagos tabletės plėvelėje yra hipromeliozė, titano dioksidas (E171), makrogolis 6000, talkas.

### **Ibuprofen Inteli išvaizda ir kiekis pakuotėje**

Plėvele dengtos tabletės yra abipus išgaubtos, pailgos, baltos arba beveik baltos spalvos, dengtos plėvele, vienoje tabletės pusėje įspausta „I600“. Tabletės dydis: 17,4 mm x 8,4 mm. Kiekvienoje pakuotėje yra 10, 20 arba 30 tablečių, lignoninėms skirtose pakuotėse – 500 tablečių, kurios supakuotos į PVC ir aliuminio folijos lizdines plokšteles.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

### **Registruotojas ir gamintojas**

#### *Registruotojas*

UAB „INTELI GENERICS NORD“

Šeimyniškių g. 3

Vilnius, LT-09312

Lietuva

#### *Gamintojas*

LABORATORIOS NORMON S.A.

Ronda de Valdecarrizo, 6

28760 Tres Cantos – Madridas

Ispanija

**Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas 2022-12-01.**

Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje <http://www.vvkt.lt/>.